

ПРОФИЛАКТИКА УЗЕЛКОВОГО ДЕРМАТИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Заразный узелковый дерматит - трансмиссивная контагиозная вирусная болезнь крупного рогатого скота.

Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота утверждены приказом Минсельхоза России от 24.08. 2021 № 588.

Клиническими признаками острого течения болезни являются: лихорадка с повышением температуры тела до 40 °С, длящимся от 4 до 14 суток, образование узелковых уплотнений, эрозий на коже, слизистых оболочках органов дыхания, воспроизводства и пищеварения, увеличение лимфатических узлов, отек конечностей, поражение глаз, снижение удоев.

Инкубационный период составляет от 3 до 30 суток.

Источником возбудителя являются больные восприимчивые животные.

Передача возбудителя осуществляется контактным, трансмиссивным, половым и ятрогенным путями. Факторами передачи возбудителя являются продукты убоя, полученные от больных восприимчивых животных, секреты и экскреты больных восприимчивых животных, кровососущие насекомые, являющиеся переносчиками возбудителя, возможна механическая передача возбудителя членистоногими различных видов, а также через другие объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

В целях предотвращения возникновения и распространения заразного узелкового дерматита владельцы восприимчивых животных обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы, восприимчивых животных для осмотра;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, обеспечивать изоляцию трупов павших восприимчивых животных в помещении, в котором они находились;
- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в хозяйствах, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;
- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14.12. 2015 № 635;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.



МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ

Основаниями для подозрения на заразный узелковый дерматит являются:

- наличие у восприимчивых животных клинических признаков и (или) патологоанатомических изменений, характерных для заразного узелкового дерматита, указанных в пункте 3 Правил;
- выявление заразного узелкового дерматита в хозяйстве, из которого ввезены восприимчивые животные и корма для них, в течение 30 календарных дней после дня осуществления их ввоза;
- контакт восприимчивых животных с факторами передачи возбудителя;
- искусственное осеменение восприимчивых животных спермой, полученной в хозяйстве, в котором выявлен заразный узелковый дерматит в течение 30 календарных дней после дня искусственного осеменения;
- контакт восприимчивых животных с больными заразным узелковым дерматитом восприимчивыми животными в течение 30 календарных дней.

При наличии оснований для подозрения на заразный узелковый дерматит владельцы восприимчивых животных обязаны:

- сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на узелковый дерматит должностному лицу госветслужбы, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;
- содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб биологического и (или) патологического материала восприимчивых животных и направлении проб в лабораторию;
- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных с указанием количества павших восприимчивых животных за последние 30 дней.

До получения результатов диагностических исследований на заразный узелковый дерматит владельцы восприимчивых животных обязаны:

- прекратить все перемещения и перегруппировки восприимчивых животных;
- прекратить убой, а также вывоз (вывод) восприимчивых животных и вывоз продуктов их убоя;
- прекратить вывоз молока, полученного от подозреваемых в заболевании восприимчивых животных;
- прекратить вывоз кормов для восприимчивых животных, инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт подозреваемые в заболевании восприимчивые животные;
- прекратить сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных;
- исключить возможность контакта персонала, обслуживающего подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, с другими восприимчивыми животными, содержащимися в хозяйстве, и обслуживающим их персоналом;
- обеспечить обработку восприимчивых животных средствами, обеспечивающими уничтожение кровососущих насекомых, в соответствии с инструкциями по их применению;
- запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы.

МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЗЕЛКОВОГО ДЕРМАТИТА КРС

	ЗАПРЕЩАЕТСЯ	ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Эпизоотический очаг-местонахождения источника и факторов передачи возбудителя в тех границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным	- ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы восприимчивых животных (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты); - посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; - вывоз продуктов убоя восприимчивых животных; - перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства; - вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные; - вывоз молока и спермы, полученных от больных восприимчивых животных; - въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства);	клинический осмотр восприимчивых животных; вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против заразного узелкового дерматита из штаммов каприпоксвирусов согласно инструкциям по их применению; изолированное содержание больных восприимчивых животных; лечение больных восприимчивых животных лекарственными препаратами для ветеринарного применения согласно инструкциям по их применению; оборудование дезинфекционных ковриков на входе (выходе) и дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага; смена одежды и обуви персонала при входе (выходе) на территорию (с территории) эпизоотического очага, проведение дезинфекции одежды и обуви, помещений хозяйства, транспортных средств при выезде с территории хозяйства; обработка восприимчивых животных средствами, обеспечивающими уничтожение кровососущих насекомых, в соответствии с инструкциями по их применению. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, используется внутри хозяйства после термической обработки путем пастеризации при температуре 72 °С в течение 15 секунд, или стерилизации при минимальной температуре 132 °С в течение не менее одной секунды, или кипячения при 100 °С в течение не менее 5 минут либо реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от подозреваемых в заболевании и больных восприимчивых животных, и сперма, полученная от больных восприимчивых животных, уничтожаются. Корма, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные, могут скармливаться невосприимчивым к заразному узелковому дерматиту животным

Неблагополучный пункт - муниципальное образование, на территории и которого установлен эпизоотический очаг	ввоз (ввод) восприимчивых животных, не вакцинированных против заразного узелкового дерматита; вывоз (вывод) восприимчивых животных (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты); перемещение и перегруппировка восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных	клинический осмотр восприимчивых животных; вакцинация восприимчивых животных вакцинами против заразного узелкового дерматита из штаммов каприпоксвирусов согласно инструкциям по их применению; оборудование дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) неблагополучного пункта; дезинфекция транспортных средств при их выезде с территории неблагополучного пункта в соответствии с пунктом 32 Правил; обработка восприимчивых животных средствами, обеспечивающими уничтожение кровососущих насекомых, в соответствии с инструкциями по их применению.
Угрожаемая зона - территория, прилегающая к неблагополучному пункту, радиус которой составляет от 10 до 20 км от его границ	ввоз (ввод) не вакцинированных против заразного узелкового дерматита восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты); проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.	клинический осмотр восприимчивых животных; вакцинация восприимчивых животных вакцинами против заразного узелкового дерматита из штаммов каприпоксвирусов согласно инструкциям их по применению; обработка восприимчивых животных средствами, обеспечивающими уничтожение кровососущих насекомых, в соответствии с инструкциями по применению



Отмена карантина осуществляется через 30 календарных дней после дня выздоровления или убоя последнего больного восприимчивого животного в эпизоотическом очаге и проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота утверждены приказом Минсельхоза России от 24.08. 2021 № 588.

